体外衝撃波結石破砕術受けられる方へ

様

月日	入院・当日		１日目・退院
経過	処置前	処置後	
	/	/	/
処置・検査	☆治療時刻は［　　：　　］ の予定です 治療15分前に排尿をすませて下さい 排尿後に痛みの予防の為、坐薬を使用します （喘息の既往・ボルタレン坐薬にアレルギーのある方は、 お知らせください）		医師の診察があります
安静	手術前は病室でお待ちください	特に制限はありません	
食事	治療の３時間前（　　）時から食事は 食べられません 治療の２時間前（　　）時から水分は飲めません	気分が優れないなどの症状が無ければ、帰室後より飲食できます 病院食は夕食からの提供となります 昼食は売店やレストランの使用をお願いいたします	
治療・薬剤	当日朝の内服薬は（あります/ありません） 指示がある内服薬 （　　）	手術室で腕に点滴が挿入されます 点滴終了後針を抜きます 普段飲んでいる薬は通常通り飲んで頂いて構いません 夕食後より抗生剤の内服をします	抗生剤の内服は、飲みきり終了です
清潔	自宅で入浴をすませて来て下さい		
排泄	記録表を使用し尿量を記載します 排石の有無を確認する為、尿を濾します	処置後、最初の尿は看護師が量や色などを確認しますので、 お知らせください	
その他	治療の流れを説明します ＊処置に対して承諾された同意書がある場合、 病院提出分を看護師にお渡しください 貴重品はセーフティーボックスに入れ、鍵はご家族に お預けください	処置後、尿が出づらい感じや痛みがあった場合、看護師まで お知らせ下さい 結石が出ましたら看護師までお知らせ下さい 処置後は血尿がでます 血尿を薄めたり、排石を促すために、処置後は 水分をたくさん飲んで下さい（１日２Ｌが目安です）	水分は控えず、積極的に摂取する ようにしてください 状態が落ち着いていれば退院です 退院後の生活に制限はありません

※退院までの経過には個人差があります。この治療計画通りには経過しないこともありますので、ご了承ください。

千葉市立青葉病院