

診療科	疾患名	レジメン名	抗がん剤（一般名）	用量	投与間隔	備考		
呼吸器	非小細胞肺癌 (NSCLC)	AMR	アムルピシシ	40mg/m2	静注 Day1,2,3	3~4週間毎		
		PEM		2g/日（連日）	経口	PEM投与7日前よりPEM最終投与日から22日まで	3~4週間毎	
			シアノコバラミン注	1mg（9週間ごと）	静注			
			ペメトレキセド	500mg/m2	静注 Day1			
		nab-PTX+CBDCA	バクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m2	静注	Day1,8,15	3~4週間毎	
			カルボプラチン	AUC6	静注	Day1		
		CBDCA+PEM		2g/日（連日）	経口	PEM投与7日前よりPEM最終投与日から22日まで	3~4週間毎	
			シアノコバラミン注	1mg（9週間ごと）	静注			
			カルボプラチン	AUC6	静注			Day1
			ペメトレキセド	500mg/m2	静注			Day1
		PEM+BEV		2g/日（連日）	経口	PEM投与7日前よりPEM最終投与日から22日まで	3週間毎	
			シアノコバラミン注	1mg（9週間ごと）	静注			
			ペメトレキセド	500mg/m2	静注			Day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	静注			Day1
		PEM+CDDP short		2g/日（連日）	経口	PEM投与7日前よりPEM最終投与日から22日まで	3~4週間毎	
			シアノコバラミン注	1mg（9週間ごと）	静注			
			ペメトレキセド	500mg/m2	静注			Day1
			シスプラチン	75mg/m2	静注			Day1
		CDDP+BEV+PEM short		2g/日（連日）	経口	PEM投与7日前よりPEM最終投与日から22日まで	3~4週間毎	
			シアノコバラミン注	1mg（9週間ごと）	静注			
			ペメトレキセド	500mg/m2	静注			Day1
			シスプラチン	75mg/m2	静注			Day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	静注			Day1
		Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200mg/body	静注	Day1	3週間毎	
Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	静注	Day1	2週間毎			
Pembrolizumab+CBDCA+PEM		2g/日（連日）	経口	PEM投与7日前よりPEM最終投与日から22日まで	3週間毎			
	シアノコバラミン注	1mg（9週間ごと）	静注					
	ペムブロリズマブ	200mg/body	静注			Day1		
	ペメトレキセド	500mg/m2	静注			Day1		
Pembrolizumab+PEM		2g/日（連日）	経口	PEM投与7日前よりPEM最終投与日から22日まで	3週間毎			
	シアノコバラミン注	1mg（9週間ごと）	静注					
	ペムブロリズマブ	200mg/body	静注			Day1		
	ペメトレキセド	500mg/m2	静注			Day1		
CBDCA+S-1	カルボプラチン	AUC5	静注	Day1	3~4週間毎			
	エスワン	80~120mg/日	経口	Day1~14				