

診療科	疾患名	レジメン名	抗がん剤（一般名）	用量	投与間隔	備考
血液	急性骨髄性白血病 (AML)	Venetoclax+Aza	アザシチジン注	75mg/m ²	静注 皮下注	Day1~7
			ベネトクラクス錠	第1日目 100mg 第2日目 200mg 第3日目以降 400mg それぞれ1日1回、7日間食後 その後の維持投与期は、400mgを1日1回、食後に経口投与する。		4週間毎
	Venetoclax+LDAC	シタラビン注	20mg/m ²	皮下注	Day1~10	
		ベネトクラクス錠	第1日目 100mg 第2日目 200mg 第3日目 400mg 第4日目以降 600mg それぞれ1日1回、7日間食後 その後の維持投与期は、600mgを1日1回、食後に経口投与する。		4週間毎	
	急性リンパ性白血病 (ALL)	ALL_maintenance	ピンクリスチン	1.3mg/m ² (最大2mg/body)	静注	Day1
			プレドニゾン注	60mg/m ²	静注	Day1~5
			もしくは、プレドニゾン錠	60mg/m ² 分3	経口	
			メトトレキサート錠	20mg/m ² 分1 就寝前	経口	Day1,8,15,22
		ALL_202U_M1(M3)	メルカプトプリン散	60mg/m ² 分1 就寝前	経口	Day1~28
			メトトレキサート注	150mg/m ²	静注	Day1,15,29
			6メルカプトプリン散	50mg/m ² 分1 就寝前	経口	Day1~28
			メトトレキサート注	12mg/body		
		ALL_202U_M2	シタラビン注	30mg/body	胸腔内	Day29
			コハク酸エステルナトリウム	25mg/body		
			シクロホスファミド注	600mg/m ²	静注	Day8
			ピンクリスチン注	1.5mg/m ² (最大2mg/body)	静注	Day1,8,15
	ALL_202U_M4	ヒアスバラギナーゼ注	10,000U/m ² 筋肉内注射	筋注	Day1,8,15	
		プレドニゾン錠	40mg/m ²	経口	Day1-14	
		ビラルビン注	25mg/m ²	静注	Day8	
		ピンクリスチン注	1.5mg/m ² (最大2mg/body)	静注	Day1,8,15	
IO (非寛解時)	ヒドロコルチゾン	100mg/body	静注	Day1		
	コハク酸エステルナトリウム	100mg/body	静注	Day1		
IO (寛解時)	ヒドロコルチゾン	100mg/body	静注	Day1		
	コハク酸エステルナトリウム	100mg/body	静注	Day1		
慢性リンパ性白血病 (CLL)	R-FCM	ヒドロコルチゾン	100mg/body	静注	Day1	
		コハク酸エステルナトリウム	100mg/body	静注	Day1	
		リツキシマブ注	375mg/m ²	静注	Day1	
		ミトキサントロン注	8mg/m ²	静注	Day2	
		フルダラビン注	20mg/m ²	静注	Day2~4	
	Benda (CLL) R-Benda	もしくは、フルダラビン錠	40mg/m ²	経口	Day2~4	
		シクロホスファミド	200mg/m ²		Day2~4	
		ベンダムスチン注	100mg/m ²	静注	Day1,2	
		ヒドロコルチゾン	100mg/body	静注	Day1	
		コハク酸エステルナトリウム	100mg/body	静注	Day1	
Ven_Rit	リツキシマブ	375mg/m ²	静注	Day1		
	ベンダムスチン注	90mg/m ²	静注	Day1,2		
	ヒドロコルチゾン	100mg/body	静注	Day1		
成人T細胞白血病 (ATL)	ボテリジオ	ヒドロコルチゾン	100mg/body	静注	Day1	
		コハク酸エステルナトリウム	100mg/body	静注	Day1	
		モガムリスマブ	1mg/kg	静注	Day1	