大腸癌

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	投与間隔
CAPOX	カペシタビン	1000mg/ ㎡ /回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	オキサリプラチン	130mg/ m ²	120分	day1	
CAPOX+BEV	カペシタビン	1000mg/ ㎡ /回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	オキサリプラチン	130mg/ m ²	120分	day1	
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
CAPOX+PANI	カペシタビン	1000mg/ ㎡ /回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	オキサリプラチン	130mg/ m ²	120分	day1	
	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	
Capecitabine+BEV	カペシタビン	1000mg/ m ੈ/回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
FTD/TPI+BEV	ロンサーフ	35mg/ ㎡ /回	1日2回内服	day1-5、8-12	4週毎
	ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1 、 15	
SOX	エスワン	体表面積に応じて40~60mg/回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	オキサリプラチン	130mg/ m ²	120分	day1	
SOX+BEV	エスワン	体表面積に応じて40~60mg/回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	オキサリプラチン	130mg/ m ²	120分	day1	
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
SOX+PANI	エスワン	体表面積に応じて40~60mg/回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	オキサリプラチン	130mg/ m ²	120分	day1	
	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	
FOLFOX	オキサリプラチン	85mg/ m ²	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m ²	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m ²	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1-2	
FOLFOX+BEV	オキサリプラチン	85mg/ m ²	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m ²	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m ²	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
	ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
FOLFOX+PANI	オキサリプラチン	85mg/ m ²	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m ²	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m i	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m i	46時間	day1-2	
	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	

FOLFOX+CET	オキサリプラチン	85mg/ m ²	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1-2	
	アービタックス	初回400mg/mੈ	120分	day1、8	
		2回目以降250mg/㎡	60分		
S-1+IRI	エスワン	体表面積に応じて40~60mg/回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	イリノテカン	150mg/ m ੀ	90分	day1	
S-1+IRI+BEV	エスワン	体表面積に応じて40~60mg/回	1日2回内服	day1-14	3週毎
	イリノテカン	150mg/ m ੀ	90分	day1	
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
FOLFIRI	イリノテカン	150mg/ m ੀ	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m i	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m ²	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1-2	
FOLFIRI+BEV	イリノテカン	150mg/ m ੈ	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m i	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m ²	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1-2	
	ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
FOLFIRI+PANI	イリノテカン	150mg/ m i	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m ²	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m i	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1-2	
	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	
FOLFIRI+CET	イリノテカン	150mg/ m ੀ	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m i	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m i	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1-2	
	アービタックス	初回400mg/ m ੰ	120分	day1、8	
		2回目以降250mg/㎡	60分		
FOLFIRI+RAM	イリノテカン	150mg/ m ²	120分	day1	2週毎
	レボホリナート	200mg/ m ²	120分	day1	
	フルオロウラシル	400mg/ m ²	5分	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1-2	
	サイラムザ	8mg/kg	60分(2回目以降30分)	day1	

FOLFOXIRI+BEV	イリノテカン	165mg/ m ²	60分	day1	2週毎
	オキサリプラチン	85mg/ m ²	120分	day1	_,,
	レボホリナート	200mg/m²	120分	day1	
	フルオロウラシル	3200mg/ m ²	46時間	day1-2	
	ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
IRI	イリノテカン	150mg/ m ²	90分	day1	2週毎
IRI+PANI	イリノテカン	150mg/ m ²	90分	day1	2週毎
	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	
IRI(毎週投与)+CET	イリノテカン	100mg/ m ²	90分	day1、8、15、22	6週毎
	アービタックス	初回400mg/ m ẩ	120分	day1、8、15、22、29、36	
		2回目以降250mg/m [*]	60分		
infusional5-FU+I-LV+BEV	フルオロウラシル	400mg/ m ²	5分	day1	2週毎
	フルオロウラシル	2400mg/ m ²	46時間	day1−2	
	ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分)	day1	
PANI	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	2週毎
CET(毎週投与)	アービタックス	初回400mg/ m ²	120分	day1	1週毎
		2回目以降250mg/ ㎡	60分		
CET(隔週投与)	アービタックス	500mg/ m ²	120分	day1	2週毎
CET+エンコラフェニブ ± ビニメチニブ	「アービタックス	500mg/ m ²	120分	day1	2週毎
	ビラフトビ	300mg/□	1日1回内服	連日	
	メクトビ	45mg/□	1日2回内服	連日	
		初回	٥,4	day1	-
 ペルツズマブ+トラスツズマブ	フェスゴ	フェスゴ配合皮下注IN 15mL	8分	·	0.周年
ハルンスマン+トラスツスマン	配合皮下注	2回目以降	FΛ		3週毎
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	フェスゴ配合皮下注MA 10mL	5分		
0					0005/50 0

2025年9月